DLP 17-6-818 J 7514

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES!

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISUN DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

ABONNEMENT ANNUEL 40 F
Régisseur de récettes de le D.D.A
C.C.P Montpellier 5238-67

Le 11 Juin 1981

EDITION du LIMOUXIN N° 6

(avis rédigé en collaboration avec la C.A.V.A.L.E.)

OIDIUM: cette maladie demeure redoutable. Restez vigilant. Incorporez à la spécialité anti-mildiou de votre choix, du soufre mouillable (THIOVIT ou MICROTHIOL spécial) à la dose de 8 à 10 kg de produit commercial à l'hectare.

Il serait particulièrement utile de procéder en outre à un soufrage à raison de 40 kg à l'hectare (formulation classique).

MILDIOU : la période de floraison est particulièrement sensible au Mildiou. Aussi, nous vous conseillons de renouveler le traitement avec

soit des produits classiques (préventifs)

soit de préférence avec des produits pénétrants ou systémiques

se reporter au bulletin n° 5.

Anti-mildiou:

- à action pénétrante :

curzate - cymoxanile : les ANTEOR, les REMILTINE, les CUPROFIX CZ

- à action systémique :

métalaxyl : les ACYLON milfurame : les CALTAN

éthylphosphite : MIKAL et RHODAX

BOTRYTIS: bien que les conditions climatiques de ces derniers jours soient peu favorables à ce champignon nous vous conseillons, si vous êtes dans une situation sensible à cette maladie, d'utiliser pour le traitement Mildiou recommandé, une spécialité polyvalente (agissant contre le Botrytis et le Mildiou).

IIN	AVITC	SPECIFIQUE	CFRA	DONNE	FN	TEMPS	HTTTE
OI	UATO	DI POTI TOOP	DRIVE	DOMME	TOTA	TELH O	OITLE

P.12

TORDEUSES (Eudémis - Cochylis)

06617-8-81817511

Les attaques de la première génération sont demeurées de faible intensité et très irrégulières selon les secteurs et les cépages. La décision de traitement ne peut être prise qu'après une observation minutieuse de vos parcelles. Vous retiendrez que le seuil de risque est atteint lorsqu'on trouve une moyenne de 1,5 chenille à 2 chenilles en moyenne par grappe. Le produit à utiliser est à choisir parmi :

ULTRACIDE 20 liquide : 2 litres de produit commercial à l'hectare

LANNATE : 2 litres de " " "

VERFOR : 2 litres de " " "

DECIS : 0,350 litre de " " "

PENNCAP : 1,5 litre de " " "

RODHIATOX acaricide : 2,5 litres de " " "

Veillez à bien mouiller les grappes y compris avec la spécialité PENNCAP. Seul RHODIATOX acaricide émet des vapeurs en quantité suffisante pour corriger les imperfections du travail.

PYRALE: des montées de Pyrale sont signalées. Leur traitement coıncide avec celui de la première génération des vers de la grappe.

Produits à utiliser :

DECIS : 0,350 litre de produit commercial à l'hectare

1'INGENIEUR en CHEF d'AGRONOMIE CHEF de CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUDE

lies polyvalente (agissant contre le Botrytis et le Middieu)

CASC A Promotion to an I for (dT. L. water 10 a) . ABILIBET VOR LEGACO STORY in the Common transfer to the Case of the Case of

Tirage du 11 juin 1981 - 1000 exemplaires